À l'attention personnelle de

Cabinet dentaire des Drs Philippe et Pauline COQUELIN
Chirurgiens-dentistes à Maen-Roch (Saint-Brice-en-Coglès), proche de Fougères et Saint James
2 rue Planche-Thomas - Saint Brice en Cogles 35460 MAEN ROCH
Tel. : +33 2 99 97 82 20
www.drscoquelin.fr

Traitement chirurgical : les lambeaux d'assainissement

Les lambeaux d'assainissement sont un traitement chirurgical permettant de traiter une parodontite (déchaussement des dents).

INDICATIONS

Les lambeaux d'assainissement sont en général proposés en deuxième intention dans le traitement de la parodontite. Ils viennent compléter un traitement non chirurgical (le surfaçage) lorsque les résultats obtenus avec celui-ci ne sont pas suffisants.

OBJECTIFS

> Accéder largement aux racines des dents et à l'os qui les entoure.
> Avoir une vision directe des zones qui sont à assainir.
> Nettoyer et décontaminer en profondeur les zones atteintes.

EN PRATIQUE

> L'intervention se réalise sous anesthésie locale.
> La gencive est soulevée a minima pour mettre les racines et l'os à nu.
> Un nettoyage complet des éléments à traiter est réalisé.

Des biomatériaux de réparation osseuse peuvent être proposés pour renforcer l'os, si la forme de la lésion s'y prête.

Il est possible de constater ensuite une légère rétraction de la gencive. Ce phénomène est normal.

Cette rétraction de la gencive est parfois être associée à une augmentation transitoire de la sensibilité des dents au chaud et au froid, qui sera atténuée par l'utilisation de gels ou de dentifrices spécifiques.

À SAVOIR

Après un lambeau d'assainissement, la mobilité des dents peut être augmentée de façon transitoire ; ce phénomène est normal et fait partie du processus de cicatrisation.